

BOLLETTINO di DIFESA della VITE

n° 13 del 1 agosto 2025

Informazioni generali e normative

La pubblicazione del bollettino di difesa della vite rappresenta la sintesi dell'attività dei tecnici operanti nelle aziende vitivinicole di Montepulciano, con il coordinamento del dott. Donato Bagnulo, e si basa sui dati agrometeorologici rilevati dalle capannine meteo installate sul territorio.

Agrometeorologia

Nel periodo compreso tra il 25 luglio e il 1^a agosto, le condizioni meteorologiche a Montepulciano hanno riconfermato un quadro tipicamente estivo. Le temperature massime diurne registrate hanno oscillato tra i 32 °C e i 34 °C, con punte di caldo intenso (es. 27 luglio fino a 34 °C). Le temperature minime notturne, si sono abbassate attestandosi dai 16 °C fino ai 14 °C, condizioni favorevoli ad un regolare ed omogeneo avanzamento dell'invasatura.

Stadio fenologico SANGIOVESE

La fase fenologica del Sangiovese oscilla dal 30% di invasatura nelle zone più tardive, fino al 80% circa delle zone più precoci.

Situazione fitopatologica generale

Peronospora della vite

Considerando il procedere regolare dell'invasatura e l'avanzamento della stagione, il rischio è molto basso, pertanto si ritiene terminata la difesa da peronospora. L'intervento con un trattamento è consigliato solo nei casi in cui vi sia un concreto rischio di perdita della superficie fogliare (canopy).

Oidio

In alcuni casi perdurano condizioni di fase epidemica, con presenza di sintomi anche su grappolo, in questi casi mantenere la copertura con zolfo bagnabile in miscela a dosaggi medi, in assenza di infezioni è possibile ridurre il dosaggio.

Scaphoideus titanus

Il monitoraggio degli adulti dello Scaphoideus, la cicalina vettrice della Flavescenza dorata, deve essere effettuato utilizzando apposite trappole cromotropiche ed ha anche la finalità di verificare l'efficacia dei trattamenti insetticidi obbligatorio eseguiti. Le trappole vanno esposte nei vigneti per due settimane (installazione in vigneto questa settimana o inizio prossima. Le trappole vanno posizionate a livello della prima coppia di fili all'interno

della vegetazione, facendo in modo che le foglie non si attacchino alla trappola, collocandole nella parte del vigneto più prossima a boschi o bordure vegetali.

Tignoletta della vite

Il terzo volo è in atto nella maggior parte del territorio comunale, si osservano larve di I e II età appartenenti alla terza generazione. Si raccomanda di proseguire il monitoraggio mediante trappole a feromoni e osservazioni dirette di uva nei grappoli.

L'intervento insetticida è giustificato solo al superamento della soglia di tolleranza, che può variare, in base ai contesti regionali, tra il 3% e il 10% dei grappoli con presenza di uova o giovani larve.

Botritis cinerea

La stagione prosegue con condizioni meteorologiche generalmente asciutte e stabili, ma il vigneto si avvicina a una fase fenologica critica, in cui la sensibilità dell'uva a patogeni e stress ambientali può aumentare. In particolare nei vigneti in cui il diradamento non è stato eseguito tempestivamente, o dove il trattamento in pre-chiusura del grappolo è stato ritardato o omesso, la vulnerabilità sanitaria è elevata, soprattutto in presenza di umidità residua nelle chiome.

Valutare attentamente l'opportunità di eseguire una defogliazione mirata in prossimità del grappolo, al fine di:

- Favorire l'aerazione della zona fruttifera;
- Ridurre l'umidità relativa tra i grappoli;
- Aumentare l'efficacia dei trattamenti, ove necessari.

Prestare particolare attenzione al rischio di scottature solari (sunburn), nei versanti esposti e durante giornate con elevate temperature.

Consigli

Per chi non lo avesse ancora fatto, in questa fase è particolarmente importante intervenire con la **definizione del corretto carico produttivo, attraverso operazioni di diradamento o selezione dei grappoli**, in funzione dell'obiettivo enologico, del potenziale del vigneto e dello stato vegetativo delle piante.

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.